

ZUSAMMENFASSUNG DER MERKMALE DES ARZNEIMITTELS (Kurzfassung)

Bezeichnung des Arzneimittels

Nasonex aquosum - Nasenspray
50 µg/Sprühstoß, Suspension

Qualitative und quantitative Zusammensetzung

50 µg Mometasonfuroat (als Monohydrat)/Sprühstoß.

Liste der sonstigen Bestandteile:

Dispersible Cellulose (mikrokristalline Cellulose und Carmellose-Natrium), Glycerol, Natriumcitrat, Citronensäure-Monohydrat, Polysorbat 80, Benzalkoniumchlorid und gereinigtes Wasser.
Dieses Arzneimittel enthält 0,02 mg Benzalkoniumchlorid pro Sprühstoß.

Anwendungsgebiete

Nasonex aquosum – Nasenspray ist zur Anwendung bei Erwachsenen und bei Kindern ab 3 Jahren zur symptomatischen Behandlung einer saisonalen allergischen oder perennialen Rhinitis bestimmt.

Nasonex aquosum – Nasenspray ist zur Behandlung einer Polyposis nasi bei erwachsenen Patienten ab 18 Jahren bestimmt.

Gegenanzeigen

Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff, Mometasonfuroat, oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile.

Nasonex aquosum – Nasenspray darf nicht angewendet werden, wenn eine unbehandelte Infektion im Bereich der Nasenschleimhaut, wie Herpes simplex, vorliegt.
Aufgrund der hemmenden Wirkung von Kortikosteroiden auf die Wundheilung, sollten Patienten nach Nasenoperationen oder -verletzungen bis zur Ausheilung Kortikosteroide nicht nasal anwenden.

Ausgewählte besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Bitte beachten Sie die vollständigen Angaben in der aktuellen Fachinformation zu:
Immunsuppression, lokale nasale Wirkungen, Nasenscheidewandperforation, Epistaxis, Benzalkoniumchlorid, systemische Wirkungen der Kortikosteroide, Polyposis nasi, Auswirkungen auf das Wachstum bei Kindern, nicht-nasale Symptome.

Ausgewählte Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen

Bitte beachten Sie die vollständigen Angaben zu pharmakokinetischen und pharmakodynamischen Wechselwirkungen in der aktuellen Fachinformation, insbesondere zu CYP3A-Inhibitoren.

Ausgewählte Nebenwirkungen

Sehr häufige Nebenwirkungen ($\geq 1/10$): Epistaxis.
Bitte beachten Sie die vollständigen Angaben in der aktuellen Fachinformation.

Pharmazeutischer Unternehmer

Oranon Healthcare GmbH, Pestalozzistr. 31, 80469 München, Deutschland

Stand der Information: März 2024

Pharmakotherapeutische Gruppe:

Schleimhautabschwellende und andere Arzneimittel zur topischen Anwendung in der Nase - Kortikosteroide,
ATC-Code: R01 A D09

Rezeptpflicht/Apothekenpflicht

Rp, apothekenpflichtig, NR

Weitere Angaben zu Dosierung und Art der Anwendung, Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen, Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit, Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen, Nebenwirkungen, Überdosierung, Pharmakologische Eigenschaften und Pharmazeutische Angaben sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen.