

Renflexis 100 mg

Infliximabe

Cartão de Alerta do Paciente

Nome do(a) paciente:

Nome do(a) médico(a):

Número de telefone do(a) médico(a):

Este Cartão de Alerta contém informações de segurança importantes que você precisa conhecer antes e durante o tratamento com Renflexis.

Mostre este cartão para qualquer médico envolvido em seu tratamento.

Leia a 'Bula' de Renflexis cuidadosamente antes de começar a utilizar este medicamento.

Data de início do tratamento com Renflexis:

Administrações atuais:

É importante que você e seu médico registrem o nome comercial e o número de lote de seus medicamentos.

Peça ao seu médico que registre o tipo e a data da(s) última(s) triagem(ns) para Tuberculose (TB) abaixo:

Teste:

Data:

Resultado:

Por favor, assegure que você também tenha uma lista de todos os outros medicamentos que está utilizando em qualquer visita a um profissional de saúde.

Lista de alergias:

Lista de outros medicamentos:

Infecções

Antes do tratamento com Renflexis

- Diga ao seu médico se você tiver uma infecção, mesmo que ela seja muito pequena.
- É muito importante que você diga ao seu médico se você já teve tuberculose (TB), ou se você esteve em contato direto com alguém que teve TB. Seu médico examinará você para verificar se você tem TB. Peça ao seu médico que registre o tipo e a data da(s) última(s) triagem(ns) para TB no cartão.
- Diga ao seu médico se você tem hepatite B ou se você sabe ou suspeita que você é portador(a) do vírus da hepatite B.

Durante o tratamento com Renflexis

- Diga ao seu médico imediatamente se você apresenta sinais de infecção. Os sinais incluem febre, sensação de cansaço, tosse (persistente), falta de ar, perda de peso, suor noturno, diarreia, feridas, problemas dentários, ardência ao urinar ou sinais 'semelhantes aos da gripe'.

Gravidez, Amamentação e Vacinações

- Caso você tenha recebido Renflexis enquanto estava grávida ou se estiver amamentando, é importante que você informe o médico de seu bebê sobre isso antes que o seu bebê receba qualquer vacina. O seu bebê não deve receber nenhuma 'vacina viva' como a BCG (utilizada para prevenir a tuberculose) dentro de 12 meses após o nascimento ou enquanto você estiver amamentando, a menos que o médico do seu bebê recomende o contrário.

Mantenha este cartão com você por 4 meses depois de sua última dose de Renflexis, ou, em caso de gravidez, por pelo menos 12 meses depois do nascimento do seu bebê. Podem ocorrer efeitos colaterais após um longo tempo depois de sua última dose.

Referência bibliográfica: Bula Renflexis (infliximabe) que pode ser encontrada no site da ANVISA (<http://portal.anvisa.gov.br/>).

Para mais informações entre em contato com a

Central de Atendimento:

0800 00 00 149 ou

contate@organon.com

 ORGANON