

**LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE
DE VOTRE MÉDICAMENT**

RENSEIGNEMENTS POUR LE PATIENT SUR LE MÉDICAMENT

** DIPROLENE®
pommade de dipropionate de bétaméthasone**

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à utiliser **DIPROLENE®** et lors de chaque renouvellement de prescription. L'information présentée ici est un résumé et ne couvre pas tout ce qui a trait à ce médicament. Parlez de votre état de santé et de votre traitement à votre professionnel de la santé et demandez-lui s'il possède de nouveaux renseignements au sujet de **DIPROLENE®**.

Pourquoi DIPROLENE® est-il utilisé?

DIPROLENE® est utilisé chez les adultes et les enfants de plus de 12 ans, sur la peau, pour soulager la rougeur, l'enflure, la chaleur, la douleur et les démangeaisons causées par le psoriasis et d'autres problèmes cutanés.

Comment DIPROLENE® agit-il?

DIPROLENE® réduit l'inflammation et entraîne la contraction des vaisseaux sanguins pour aider à soulager l'enflure, la rougeur, la chaleur, la douleur et les démangeaisons.

Quels sont les ingrédients de DIPROLENE®?

Ingrédient médicamenteux : dipropionate de bétaméthasone

Ingrédients non médicamenteux : propylèneglycol, stéarate de propylèneglycol, cire d'abeille blanche et paraffine molle blanche

DIPROLENE® est offert sous la forme posologique qui suit :

Pommade à 0,05 % p/p

N'utilisez pas DIPROLENE® si vous :

- êtes allergique au dipropionate de bétaméthasone ou à tout autre ingrédient de **DIPROLENE®**;
- êtes allergique à un médicament similaire (corticostéroïde);
- souffrez d'une infection comme la variole, la varicelle, les feux sauvages ou l'herpès génital, d'une infection fongique ou d'une tuberculose cutanée.

Consultez votre professionnel de la santé avant d'utiliser DIPROLENE®, afin de réduire la possibilité d'effets secondaires et pour assurer la bonne utilisation du médicament.

Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, notamment :

- si vous utilisez déjà un médicament similaire (corticostéroïde);
- si vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir. On ignore si **DIPROLENE®** peut être nocif pour le bébé à naître. Votre professionnel de la santé décidera si les bienfaits de **DIPROLENE®** l'emportent sur les risques pour le bébé à naître;
- si vous allaitez ou prévoyez le faire. On ignore si **DIPROLENE®** passe dans le lait maternel. Votre professionnel de la santé décidera si vous devez cesser d'allaiter ou cesser d'utiliser **DIPROLENE®**;
- si vous souffrez d'une infection;

- si vous souffrez de maladies de la peau causées par une mauvaise circulation sanguine, par exemple une dermatite de stase;
- si vous présentez une augmentation de la pression dans vos yeux (glaucome).

Autres mises en garde à connaître :

Ne pas utiliser **DIPROLENE®** dans les yeux ou près des yeux.

Ne pas utiliser **DIPROLENE®** sous un pansement imperméable à l'air et à l'eau (occlusif).

Avisez votre professionnel de la santé de tous les autres médicaments que vous prenez, y compris les médicaments sans ordonnance, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les produits de médecine complémentaire.

Comment prendre DIPROLENE® :

Dose habituelle : Appliquer une mince couche, le matin, de façon à couvrir la région affectée. On peut aussi l'appliquer deux fois par jour, le matin et le soir, ou selon les consignes de votre professionnel de la santé.

Surdosage :

Si vous croyez avoir appliqué trop de **DIPROLENE®**, communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou votre centre antipoison régional, même si vous ne présentez pas de symptômes.

Dose oubliée :

Si vous oubliez d'appliquer ce médicament, appliquez-le dès que vous vous rendez compte de votre oubli. S'il est presque l'heure de l'application suivante, sautez l'application oubliée et poursuivez avec l'application suivante prévue, puis reprenez l'horaire normal. N'appliquez pas une double quantité de médicament.

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à DIPROLENE®?

En utilisant **DIPROLENE®**, vous pourriez ressentir des effets secondaires autres que ceux qui figurent dans cette liste. Si c'est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Les effets secondaires suivants ont été signalés :

- Démangeaisons, sécheresse, picotement, sensation de brûlure, irritation
- Rougeur accrue
- Cloques
- Amincissement de la peau
- Enflure des follicules pileux
- Vergetures
- Apparition de petits vaisseaux rouges sous la peau (télangiectasie en araignées)
- Croissance excessive des cheveux
- Changement de la pigmentation de la peau
- Infection secondaire
- Éruption cutanée autour de la bouche

- Éruption cutanée rouge et accompagnée de démangeaisons causées par une réaction allergique ou par contact avec une substance (eczéma de contact allergique)
- Ramollissement ou altération de la peau en raison de l'humidité
- Acné, rosacée
- Boutons de chaleur
- Urticaire
- Vision brouillée

L'utilisation de **DIPROLENE**[®] peut influencer le fonctionnement de vos glandes surrénales, ce qui peut entraîner des symptômes comme un visage rond (faciès lunaire), des vergetures et un ralentissement de la croissance chez les enfants. Si vous présentez un de ces symptômes, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Si vous présentez un symptôme ou un effet indésirable qui n'a pas été mentionné dans ce dépliant ou qui vous empêche d'effectuer vos activités quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnés d'être associés avec l'utilisation d'un produit de santé à Santé Canada en :

- Visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada.html>) pour savoir comment faire une déclaration en ligne, par courrier ou par télécopieur; ou
- Téléphonant sans frais au 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux.

Entreposage :

Conservez entre 15 et 30 °C.

Gardez hors de la portée et de la vue des enfants.

Pour en savoir davantage au sujet de DIPROLENE[®] vous pouvez :

- Communiquer avec votre professionnel de la santé.
- Lire la monographie de produit intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les Renseignements pour le patient sur le médicament. Ce document est disponible sur le site Web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html>); le site Web du fabricant, www.organon.ca; ou en appelant au 1-844-820-5468.

Ce dépliant a été rédigé par Organon Canada Inc.

Dernière révision : le 13 avril 2021

® N.V. Organon, utilisée sous licence.

© 2021 Organon Canada Inc. Tous droits réservés.