

**LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET
EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT**

RENSEIGNEMENTS POUR LE PATIENT SUR LE MÉDICAMENT

PrDIPROSONE®

**crème de dipropionate de bétaméthasone
pommade de dipropionate de bétaméthasone
lotion de dipropionate de bétaméthasone USP**

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à utiliser **DIPROSONE®** et lors de chaque renouvellement de prescription. L'information présentée ici est un résumé et ne couvre pas tout ce qui a trait à ce médicament. Parlez de votre état médical et de votre traitement à votre professionnel de la santé et demandez-lui s'il possède de nouveaux renseignements au sujet de **DIPROSONE®**.

Pour quoi DIPROSONE® est-il utilisé?

DIPROSONE® est utilisé sur la peau pour soulager la rougeur, l'enflure, la chaleur, la douleur et les démangeaisons causées par l'eczéma, le psoriasis et d'autres troubles cutanés.

Comment DIPROSONE® agit-il?

DIPROSONE® réduit l'inflammation et entraîne la contraction des vaisseaux sanguins pour aider à soulager l'enflure, la rougeur, la chaleur, la douleur et les démangeaisons.

Quels sont les ingrédients de DIPROSONE®?

Ingrédient médicamenteux : dipropionate de bétaméthasone

Ingrédients non médicamenteux :

Crème : alcool cétostéarique, chlorocrésol, paraffine liquide, éther cétostéarique de macrogol, acide phosphorique, dihydrogénophosphate, sodium dihydraté, hydroxyde de sodium, eau et paraffine blanche molle.

Pommade : paraffine liquide et paraffine blanche molle.

Lotion : carbomer 934P, alcool isopropylique, hydroxyde de sodium pour ajuster le pH et eau.

DIPROSONE® est offert sous les formes posologiques qui suivent :

Crème : 0,05 % p/p

Lotion : 0,05 % p/p

Pommade : 0,05 % p/p

N'utilisez pas DIPROSONE® si vous :

- êtes allergique au dipropionate de bétaméthasone ou à tout autre ingrédient de **DIPROSONE®**;
- êtes allergique à un médicament similaire (corticostéroïde);
- souffrez d'une infection virale de la peau comme la varicelle, les feux sauvages ou l'herpès

génital, d'une infection bactérienne ou fongique de la peau ou d'une tuberculose cutanée.

Consultez votre professionnel de la santé avant d'utiliser DIPROSONE[®], afin de réduire la possibilité d'effets secondaires et pour assurer la bonne utilisation du médicament.

Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, notamment :

- si vous utilisez déjà un médicament similaire (corticostéroïde);
- si vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir. On ignore si **DIPROSONE[®]** peut être nocif pour le bébé à naître. Votre professionnel de la santé décidera si les bienfaits de **DIPROSONE[®]** l'emportent sur les risques potentiels pour le bébé à naître;
- si vous allaitez ou prévoyez le faire. On ignore si **DIPROSONE[®]** passe dans le lait maternel. Votre professionnel de la santé décidera si vous devez cesser d'allaiter ou d'utiliser **DIPROSONE[®]**;
- si vous souffrez d'une infection;
- si vous présentez une augmentation de la pression dans vos yeux (glaucome).

Autres mises en garde à connaître :

N'utilisez pas **DIPROSONE[®]** dans les yeux ni près des yeux.

N'utilisez pas **DIPROSONE[®]** sous un pansement imperméable à l'air et à l'eau (occlusif) si votre température est élevée (si vous faites de la fièvre).

La lotion **DIPROSONE[®]** contient de l'alcool et peut causer des picotements lorsqu'elle est appliquée sur une peau blessée ou brûlée par le soleil.

Conduite de véhicules et utilisation de machines : La prudence est requise lors de la conduite d'un véhicule motorisé ou lors de l'opération d'une machine dangereuse lorsqu'on utilise **DIPROSONE[®]**.

Avisez votre professionnel de la santé de tous les autres médicaments que vous prenez, y compris les médicaments sans ordonnance, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les produits de médecine complémentaire.

Comment prendre DIPROSONE[®] :

Dose habituelle : Appliquer une mince couche de **DIPROSONE[®]** pour recouvrir complètement la région affectée deux fois par jour. Masser légèrement pour faire pénétrer la crème, la pommade ou la lotion entièrement dans la peau.

Surdosage :

Si vous croyez avoir appliqué une trop grande quantité de DIPROSONE[®] , communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou votre centre antipoison régional, même si vous ne présentez pas de symptômes.
--

Dose oubliée :

Si vous oubliez une dose de ce médicament, sautez la dose oubliée et poursuivez le traitement à la dose suivante prévue. Reprenez ensuite l'horaire normal. N'appliquez pas deux doses au même moment.

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à DIPROSONE®?

Cette liste d'effets secondaires de **DIPROSONE®** n'est pas complète. Si vous ressentez d'autres effets secondaires qui ne figurent pas sur cette liste, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Les effets secondaires peuvent inclure :

- Sensation de brûlure, picotements
- Démangeaisons
- Irritation
- Sécheresse
- Enflure des follicules pileux
- Croissance excessive des cheveux
- Acné, rosacée
- Changement de la pigmentation de la peau
- Éruption cutanée autour de la bouche
- Éruption cutanée rouge et accompagnée de démangeaisons causée par une réaction allergique ou par contact avec une substance (dermatite de contact allergique)
- Vision brouillée
- Ramollissement ou altération de la peau en raison de l'humidité
- Infection après le traitement (infection secondaire)
- Amincissement de la peau
- Vergetures
- Boutons de chaleur

L'utilisation de **DIPROSONE®** peut influencer le fonctionnement de vos glandes surrénales, ce qui peut entraîner des symptômes comme un visage rond (faciès lunaire) et des vergetures. Si vous présentez un de ces symptômes, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Si vous présentez un symptôme ou un effet indésirable qui n'a pas été mentionné dans ce dépliant ou qui vous empêche d'effectuer vos activités quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnés d'être associés avec l'utilisation d'un produit de santé à Santé Canada en :

- Visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada.html>) pour vous informer sur comment faire une déclaration en ligne, par courrier, ou par télécopieur; ou
- Téléphonant sans frais au 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux.

Entreposage :

Conservez entre 15 °C et 30 °C.

Gardez hors de la portée et de la vue des enfants.

Pour en savoir davantage au sujet de DIPROSONE[®], vous pouvez :

- Communiquer avec votre professionnel de la santé.
- Lire la monographie de produit intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les renseignements pour les patients sur les médicaments. Vous pouvez vous procurer ce document en visitant le site Web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html>) ou le site du fabricant au www.organon.ca, ou en téléphonant au 1-844-820-5468.

Le présent dépliant a été rédigé par Organon Canada Inc.

Dernière révision : le 7 avril 2021

[®] N.V. Organon, utilisée sous licence.

© 2021 Organon Canada Inc. Tous droits réservés.