

**MARVELON®**, Filmtablette.

**Wirkstoff:** Desogestrel u. Ethinylestradiol. **Zus.:** 1 Filmtablette enth. Desogestrel 0,150 mg, Ethinylestradiol 0,030 mg. **Sonst. Bestandt.:** Kartoffelstärke, Povidon (K 27,0 – 32,4), Stearinsäure (Ph.Eur.), hochdisp. Siliciumdioxid,  $\alpha$ -Tocopherol (Ph.Eur.), Lactose-Monohydrat, Hypromellose, Macrogol 400, Titandioxid (E 171), Talkum. **Anw.:** Kontrazeption. **Gegenanz.:** Vorliegen/Risiko für e. VTE: besteh. (auch unter antikoag. Ther.) od. vorausgeg. VTE (z. B. TVT od. Lungenembolie); bek. erbl. od. erworbt. Prädisp. für VTE, wie APC-Resistenz (einschl. Faktor-V-Leiden), Antithrombin-III-, Protein-C- od. Protein-S-Mangel; größere OP m. läng. Immobilisier.; hoh. Risiko f. e. venö. Thromboembolie aufgr. mehrerer Risikofakt.; Vorliegen/Risiko für e. ATE: besteh./vorausgeg. od. Prodromalstadium einer ATE (z. B. Myokardinfarkt bzw. Angina pectoris); zerebrovask. Erkrank. (besteh./vorausgeg. Schlaganfall od. vorausgeg. prodromale Erkrank. [z. B. TIA]); bek. erbl. od. erworbt. Prädisp. für ATE, wie Hyperhomocysteinämie u. Antiphospholipid-AK (Antikardiolipin-AK, Lupusantikoagulans); anamn. bek. Migräne m. fok. neurolog. Sympt.; Vorliegen mehrerer Risikofakt. od. e. schwerwiegt. Faktors (wie Diabetes mellitus mit Gefäßschäd., schw. Hypertonie, schw. Dyslipoproteinämie); B. besteh. od. vorausgeg. Erkrank.: Pankreatitis m. schw. Hypertriglyzeridämie; schw. Lebererkrank. (solange abnorme Leberfunkt.-parameter bestehen); benigne od. maligne Lebertumor.; Besteh./vermut. sexualhormonabhäng. maligne Erkrank. (z. B. d. Genitale od. d. Mammae). Endometriumhyperplasie. Nicht abgeklärte. vag. Blut.; Schwangerschaft (bestehend od. vermutet); Überempf.-keit gg. d. Wirkstoffe od. e. d. sonst. Bestandt.; Komb. mit Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir u. Dasabuvir od. Glecaprevir/Pibrentasvir. **Nebenw.:** Veränd. d. vaginal. Blutungsmusters in Häufigk., Intensität od. Dauer. *Häufig:* Depress. Verstimm.; Stimmungsschwank. Kopfschm. Übelk.; abdominale Schm. Brustschm.; Spannungsgefühl in d. Brüsten. Gewichtszunahme. *Gelegentlich:* Flüssigkeitsretent. Vermind. Libido. Migräne. Erbrechen; Diarrhö. Hautausschlag; Urtikaria. Brustvergrößerung. *Selten:* Überempf.-keit. Vermehrte Libido. Beschwerden b. Tragen v. Kontaktlinsen. Venöse Thromboembolie; arterielle Thromboembolie. Erythema nodosum; Erythema multiforme. Fluor vaginalis; Brustdrüsensekretion. Gewichtsabnahme. *Nicht bekannt:* Verschlimm. d. Sympt. e. hereditären und erworbenen Angioödems. **Warnhinw.:** Enthält Lactose. Weit. Information siehe Fachinfo. **Verschreibungspflichtig.**

**Organon Healthcare GmbH, München**