

### DIPROSONE® Depot 1 ml Ampulle, 2,0 mg/ml + 5,0 mg/ml Injektionssuspension

**Wirkstoffe:** Betamethasondihydrogenphosphat-Dinatrium (Ph.Eur.), Betamethasondipropionat (Ph.Eur.). **Zus.:** 1 Amp. m. 1 ml Injekt.-suspension enth. 2,63 mg Betamethasondihydrogenphosphat-Dinatrium (entspr. 2,0 mg Betamethason) u. 6,43 mg Betamethasondipropionat (entspr. 5,0 mg Betamethason). **Sonst. Bestandt.:** Benzylalkohol, Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.), Propyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.), Natriummonohydrogenphosphat-Dihydrat (Ph.Eur.), Natriumchlorid, Natriumedetat (Ph.Eur.), Polysorbat 80, Carmellose-Natrium, Macrogol 3350, Salzsäure 36 %, Wasser für Injekt.-zwecke. **Anw.:** *Intraartikul. Injekt.:* Na. Allgemeinbehandl. v. chron.-entzündl. Gelenkerkrank. Persistierend. Entzünd. in einem od. wenigen Gelenken; Arthritis b. Pseudogicht/Chondrokalzinose; akt. Arthrose; verschied. akut. Formen d. Periarthropathia humeroscapularis. *Infiltrat.-ther.:* Tendovaginitis (strenge Indikat.-stell.); nicht bakt. Bursitis; Periarthropathien, Insert.-tendopathien; Engpass-Syndr. b. entzündl.-rheumat. Erkrank.; Enthesitiden b. Spondyloarthropathien. **Gegenanz.:** Überempfindl. gg. d. Wirkstoffe od. andere Kortikosteroide, Methyl-4-hydroxybenzoat, Propyl-4-hydroxybenzoat, Benzylalkohol od. einen d. sonst. Bestandt.; Früh- od. Neugeborene. *Intraartikul. Inj. u. Infiltrat.-ther.:* Infekt. innerh. od. in unmittelbar. Nähe d. zu behandelnd. Gelenks od. d. Applikat.-bereichs, Psoriasisherd im Applikat.-bereich, Blut.-neig. (spontan od. durch Antikoagulanzen), periartikul. Kalzifik., Instab. d. zu behandelnden Gelenks, nicht vaskularisiert. Knochennekrose, Sehnenruptur, Charcot-Gelenk. *B. länger dauernd. Ther.:* Magen-Darm-Ulzera, schw. Osteoporose, psychiat. Anamnese, akut. Infekt. (Herpes zoster, Herpes simplex, Varizellen), HBsAG-pos. chron.-akt. Hepatitis, ca. 8 Wo. vor bis 2 Wo. na. Schutzimpf., system. Mykosen u. Parasitosen, Poliomyelitis, Lymphadenitis na. BCG-Impf., Eng- und Weitwinkelglauk., Amöbeninfekt., Herpes ophthalmicus. **Nebenw.:** Lokal. Reiz.; Unverträglichkeitsersch. (Hitzegefühl, länger anhaltend. Schm.); Verletz. v. Gefäßen od. Nerven; Infekt. *Zusätzl. b. intraartikul. Anw.:* Hautatrophie; Atrophie d. Unterhautgewebes an Injekt.-stelle; Gelenkinstabilität; Verletz. v. periartikulären u. artikulären Strukturen; Charcot-artige Arthropathie; Kristallsynovitis. *Zusätzl. b. infiltrativer Anw.:* Hautatrophie u./od. Atrophie d. Unterhautgewebes m. Depigmentier. u. Lanugoverlust an d. Injekt.-stelle; Sehnenbeschäden u./od. Sehnenruptur. *System. Nebenw.:* Adrenal. Suppress. u. Indukt. eines Cushing-Syndr.; vermind. Glukosetoleranz; Diabetes mellitus; Wachstumshemm. b. Kdrn.; Stör. d. Sexualhormonsekret. (unregelm. Menstruati., Impotenz, verändert. Beweglichk. u. Anzahl d. Spermien); sekund., adrenokortik. u. hypophysär. Nichtansprechbar., bes. unter Stress, b. Trauma, chirurg. Eingriffen od. Krankh. Gewichtszun.; Hypercholesterinämie u. Hypertriglyceridämie, Natriumretent. m. Ödembild.; vermehrt. Kaliumausscheid.g (Cave: Rhythmusstör.); hypokaliäm. Alkalose; Flüssigkeitsretent.; b. prädisponiert. Pat. Stau.-herzinsuff., gesteigert. Calciumausscheid., erhöht. Bedarf an Insulin od. oral. Antidiabetika, neg. Stickstoffbilanz aufgrund Protein-Katabolismus. Striae rubrae; Atrophie; Teleangiektasien; erhöht. Kapillarfragilität; Petechien; Ekchymosen; Hypertrichose; Steroidakne; verzögert. Wundheil.; Rosazea-artige (periorale) Dermatitis; Änder. d. Hautpigmentier.; Überempfindl.-reakt., z. B. Arzneimittlexanthem, Hautverdünn., Gesichtserythem, verstärkt. Schwitzen, allerg. Dermatitis, Urtikaria, angioneurot. Ödem. Muskelatrophie u. -schwäche; Osteoporose (dosisabh., auch b. nur kurzer Anw. mögl.); asept. Knochennekrosen (Kopf d. Oberarm- u. Oberschenkelknochens); Sehnenrupt.; Wirbelfrakt.; Frakt. d. langen Röhrenknochen; kortikosteroid. Myopathie; Verschlimmer. d. Sympt. b. Myasthenia gravis; steril. Abszess. Depress.; Gereiztheit; Euphorie; Antriebs- u. Appetitsteiger.; Psychosen; Schlafstör.; Stimm.-schwank.; Persönlichkeitsveränder. Pseudotumor cerebri (insb. b. Kdrn.); Krämpfe; Manifestat. einer latent. Epilepsie; Erhöh. d. Anfallsbereitschaft b. manifest. Epilepsie; Drehschwindel; Kopfschm. Magen-Darm-Ulcera; gastrointest. Blut.; Pankreatitis; Schluckauf; Bauchbläh.; ulzerative Ösophagitis. Blutdruckerhöh., Erhöh. d. Arteriosklerose- u. Thromboserisikos; Vaskulitis (auch als Entzugssyndr. na. Langzeitther.). Mäßig. Leukozytose; Lymphopenie; Eosinopenie; Polyglobulie. Schwäch. d. Immunabwehr; Maskier. v. Infekt.; Exazerbat. latent. Infekt.; allerg.

KFI DE Diprosone Depot Ampulle\_Deletion Fertigspritze

Reakt.; anaphylaktoide od. Überempfindl.-reakt.; Blutdruckabfall; Schockreakt. Katarakt, insb. m. hinterer subcapsulärer Trüb.; Glauk.; Verschlechter. d. Sympt. b. Hornhautulcus; Begünstig. viral., fungal. und bakt. Entzünd. am Auge; Exophthalmus; verschwomm. Sehen. *Benzylalkohol*: allerg. Reakt. *Methyl-4-hydroxybenzoat. u. Propyl-4-hydroxybenzoat*: Überempfindl.-reakt. (auch Spätreakt.) u. selten Bronchospasmen (Bronchialkrampf). **Warnhinw.:** Enth. Methyl-4-hydroxybenzoat, Propyl-4-hydroxybenzoat u. Benzylalkohol. Arzneimittel f. Kinder unzugängl. aufbewahren. Weit. Informationen siehe Fach- bzw. Gebrauchsinfo. **Verschreibungspflichtig. Stand der Info:** 10/2024  
**Inhaber der Zulassung:** Organon Healthcare GmbH, München  
E-Mail: dpoc.germany@organon.com